

Se nota effetti quali, febbre, mal di gola, tosse persistente comparsa di macchie o bolle o ulcere sulla mucosa della bocca, comparsa di lividi, sangue nelle urine o nelle feci, comparsa al palmo delle mani o dei piedi di un formicolio o bruciore o gonfiore/vescicole, contatti subito il suo medico curante

Incidere sulla capacità di guidare veicoli o macchinari?

La **capecitabina** altera lievemente o moderatamente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. La capecitabina può indurre capogiri, stato di affaticamento e nausea.



Ospedale G. B. Grassi
UOSD Oncologia
UOC Farmacia Ospedaliera



Contatti Utili

Reparto Oncologico 06/56482366
Farmacia Ospedaliera 06/56482539



CAPECITABINA



Per cosa si utilizza?

- ▶ Capecitabina viene utilizzato per il trattamento dei tumori del colon, del retto, dello stomaco o della mammella.
- ▶ Capecitabina viene prescritto per prevenire nuove comparse del tumore del colon a seguito della completa rimozione chirurgica del tumore.



Come si assume?

Le compresse di Capecitabina devono essere assunte intere, sempre alla stessa ora, a stomaco pieno, entro 30 minuti dalla fine del pasto con un abbondante bicchiere d'acqua.

Accortezza!!

Dopo aver toccato le compresse si ricordi di **lavare le mani**

Come si conserva?

- Nella sua confezione originale con allegato il foglietto illustrativo
- A temperatura ambiente (15°-30° C)
- Fuori dalla portata dei bambini e lontano da fonti di calore



Schema di terapia

- ▶ Il medico prescriverà il regime di trattamento indicato per Lei. Il dosaggio è stabilito in base alla superficie corporea. Generalmente la dose abituale per gli adulti è di 1250mg/mq di superficie corporea 2 volte al dì, tale dose viene ridotta a 825mg/mq se concomitante a radioterapia in sede addominale. Ogni ciclo prevede l'assunzione di capecitabina solitamente per 14 giorni, seguiti da una pausa di 7 giorni. Sono previsti dosaggi metronomici con assunzione continua.



E se ne dimentico una da assumere?

Se si è dimenticato una o più dosi di capecitabina NON la assumi in ritardo, continui il trattamento secondo lo schema ed eventualmente si rivolga al suo medico per un consiglio.

MA ATTENZIONE!!! NON ASSUMA MAI UNA DOSE DOPPIA DI FARMACO



Quali sono le reazioni avverse più comuni?

- ▶ Crampi, Dolori addominali, Diarrea, Nausea, Vomito, Diminuzione dell'appetito,
- ▶ Affaticamento, Alterazione del gusto e Dolore alla bocca,
- ▶ Arrossamento e Dolore del palmo della mano e della pianta del piede
- ▶ Ipersensibilità al freddo e sensibilità alterata al tatto e al gusto



Piccoli Consigli utili

Arrossamenti e screpolature mani/piedi:

- Eviti acqua troppo calda e guanti di gomma
- Utilizzi detergenti delicati privi di sapone
- Utilizzi prodotti solari schermanti
- Idrati sempre le parti con una crema apposita almeno due volte al dì
- Eviti di indossare scarpe strette

Infiammazione della bocca:

- Eviti cibi acidi, piccanti, alcool e tabacco
- Faccia degli sciacqui con acqua e bicarbonato 3 volte al dì