



Incidere sulla capacità di guidare veicoli o macchinari?

IBRANCE ha una minima influenza sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Tuttavia, palbociclib può causare stanchezza e i pazienti devono prestare attenzione durante la guida o l'uso di macchinari.

Ospedale G. B. Grassi
UOSD Oncologia
UOC Farmacia Ospedaliera

Contatti Utili

Reparto Oncologico

06/56482366

Farmacia Ospedaliera

06/56482539



IBRANCE




Per cosa si utilizza?

IBRANCE è indicato per il trattamento del carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR) e negativo al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2):

- in associazione ad un inibitore dell'aromatasi;
- in associazione a fulvestrant in donne che hanno ricevuto una terapia endocrina precedente.

In donne in pre- o perimenopausa, la terapia endocrina deve essere associata ad un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH).



Prima o dopo mangiato?

Deve essere assunto con del cibo, preferibilmente un pasto, per garantire un'esposizione costante al farmaco.

Come si assume?

IBRANCE è per uso orale. Le capsule di IBRANCE devono essere **ingerite intere** (non devono essere masticate, frantumate o aperte prima di essere degluite). Non deve essere ingerita alcuna capsula che sia rotta, danneggiata o comunque non integra.



Quando assumerlo?

I pazienti devono essere incoraggiati ad assumere la dose approssimativamente alla stessa ora ogni giorno.

Come si conserva?

Questo medicinale non richiede alcuna condizione speciale di conservazione, ma comunque si consiglia di tenerlo lontano da fonti di calore e lontano dalla portata dei bambini.



E se ne dimentico una da assumere?

Se il paziente vomita o salta una dose, non deve assumere una dose supplementare nella stessa giornata. La dose prescritta successiva deve essere assunta alla solita ora.

Cibi da evitare di assumere nel periodo di trattamento?

Non deve essere assunto con pompelmo o succo di pompelmo. Infatti l'uso concomitanti di inibitori potenti del CYP3A4 (**SUCCO DI POLMPELMO**) ne altera la dose assunta.



Quali sono le reazioni avverse più comuni?

- Neutropenia
- Stomatite
- Nausea
- Vomito/Diarrea
- Alopecia/Cute secca/Eruzione cutanea
- Appetito ridotto



Cosa fare nel caso in cui si manifestino sintomi?

Le pazienti devono informare il proprio medico.

Che succede se ne assumo una dose maggiore per errore?

In caso di sovradosaggio di IBRANCE, possono verificarsi tossicità gastrointestinale (ad esempio, nausea, vomito) ed ematologica (ad esempio, neutropenia) e deve essere fornita una terapia di supporto generale. .

