



Incidere sulla capacità di guidare veicoli o macchinari?

LOKELMA non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Comunque si consiglia di prestare cautela quando si guidano veicoli o si usano macchinari.



LOKELMA



Per cosa si utilizza?

Lokelma è indicato per il trattamento dell'**Iperkaliemia** nei pazienti adulti.

Come devono essere assunte le bustine?

1) L'intero contenuto della bustina deve essere svuotato in un bicchiere contenente circa 45 mL di acqua e mescolato bene.

2) Il liquido insapore deve essere bevuto ancora torbido. La polvere non si dissolverà.

N.B.: Se la polvere si deposita, il liquido deve essere nuovamente mescolato e assunto.

3) Se necessario, risciacqua il bicchiere con altra acqua per assicurarti che tutto il contenuto venga assunto.

La sospensione può essere assunta **con o senza cibo.**



A stomaco pieno



Ospedale G. B. Grassi
UOSD Oncologia
UOC Farmacia Ospedaliera



Contatti Utili
Reparto Oncologico
Farmacia Ospedaliera

06/56482366

06/56482539



E se ne dimentico una da assumere?

Se un paziente dimentica di prendere una dose, deve assumere la dose abituale successiva all'ora stabilita.

Come si conserva?

Questo medicinale non richiede alcuna condizione speciale di conservazione, ma comunque si consiglia di tenerlo lontano da fonti di calore e lontano dalla portata dei bambini.



Quali sono le reazioni avverse più comuni?

- Ipokaliemia
- Eventi correlati all'edema come:
 - ritenzione di liquidi;
 - edema generalizzato;



Cosa fare nel caso in cui si manifestino sintomi?

I pazienti devono informare il proprio medico.

Che succede se ne assumo una dose maggiore per errore?

Il sovradosaggio di LOKELMA potrebbe causare Ipokaliemia. Il livello di potassio sierico deve essere controllato e, se necessario, bisogna integrare con potassio.

