

## INCIDE SULLA CAPACITÀ DI GUIDARE VEICOLI O MACCHINARI?

**VERZENIOS** ALTERA LIEVEMENTE LA CAPACITÀ DI GUIDARE VEICOLI E DI USARE MACCHINARI. LE PAZIENTI DEVONO PRESTARE ATTENZIONE NEL CASO IN CUI MANIFESTINO STANCHEZZA O CAPOGIRO ALLA GUIDA.



**OSPEDALE G. B. GRASSI**  
**UOSD ONCOLOGIA**  
**UOC FARMACIA OSPEDALIERA**



### CONTATTI UTILI

**REPARTO ONCOLOGICO** **06/56482366**  
**FARMACIA OSPEDALIERA** **06/56482539**



# VERZENIOS




## PER COSA SI UTILIZZA?

- *CARCINOMA MAMMARIO IN FASE INIZIALE*
- *CARCINOMA MAMMARIO AVANZATO O METASTATICO*



## COME SI ASSUME?

**VERZENIOS** È PER USO ORALE. LA COMPRESSA DEVE ESSERE DEGLUTITA INTERA (LE PAZIENTI NON DEVONO MASTICARE, ROMPERE O DIVIDERE LE COMPRESSE PRIMA DI DEGLUTIRLE)



## PRIMA O DOPO MANGIATO?

LA DOSE PUÒ ESSERE ASSUNTA **CON O SENZA CIBO**.



## QUANDO ASSUMERLO?

LE PAZIENTI DEVONO ASSUMERE LE DOSI ALL'INCIRCA ALLA **STESSA ORA** OGNI GIORNO.





### COME SI CONSERVA?

QUESTO MEDICINALE NON RICHIEDE ALCUNA CONDIZIONE SPECIALE DI CONSERVAZIONE, MA COMUNQUE SI CONSIGLIA DI TENERLO LONTANO DA FONTI DI CALORE E LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI

### CIBI DA EVITARE DI ASSUMERE NEL PERIODO DI TRATTAMENTO?

NON DEVE ESSERE ASSUNTO CON POMPELMO O SUCCO DI POMPELMO. INFATTI L'USO CONCOMITANTI DI INIBITORI POTENTI DEL CYP3A4 (SUCCO DI POLMPELMO) NE ALTERA LA DOSE ASSUNTA.



### QUALI SONO LE REAZIONI AVVERSE PIÙ COMUNI?

- DIARREA (TRA LA PIÙ COMUNE)
- STANCHEZZA
- NAUSEA
- VOMITO
- ALOPECIA
- APPETITO RIDOTTO



### COSA FARE NEL CASO IN CUI SI MANIFESTI DIARREA?

LE PAZIENTI DEVONO INIZIARE IL TRATTAMENTO CON AGENTI ANTIDIARROICI COME LOPERAMIDE AL PRIMO SEGNO DI FECI MOLLI, AUMENTARE L'ASSUNZIONE DI LIQUIDI PER VIA ORALE E INFORMARE IL PROPRIO MEDICO.

### CHE SUCCEDA SE NE ASSUMO UNA DOSE MAGGIORE PER ERRORE?

IN CASO DI SOVRADOSAGGIO DA VERZENIOS, POSSONO VERIFICARSI STANCHEZZA E DIARREA.

