



Incidere sulla capacità di guidare veicoli o macchinari?

Xtandi potrebbe alterare moderatamente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari essendo stati riferiti episodi psichiatrici e neurologici incluse convulsioni. I pazienti devono essere avvisati dei possibili rischi di andare incontro a eventi psichiatrici o neurologici durante la guida o l'uso di macchinari. Non sono stati condotti studi per valutare gli effetti di enzalutamide sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

Ospedale G. B. Grassi
UOSD Oncologia
UOC Farmacia Ospedaliera

Contatti Utili
Reparto Oncologico
Farmacia Ospedaliera

06/56482366
06/56482539




XTANDI



Per cosa si utilizza?

Xtandi è indicato per:

- ❑ il trattamento di uomini adulti con cancro della prostata metastatico ormono-sensibile in associazione con terapia di deprivazione androgenica;
- ❑ il trattamento di uomini adulti con cancro della prostata non metastatico ad alto rischio resistente alla castrazione (CRPC);
- ❑ il trattamento di uomini adulti con CRPC metastatico, asintomatici o lievemente sintomatici dopo il fallimento della terapia di deprivazione androgenica, nei quali la chemioterapia non è ancora clinicamente indicata;
- ❑ il trattamento di uomini adulti con CRPC metastatico nei quali la patologia è progredita durante o al termine della terapia con docetaxel.



Come si assume?

Xtandi è per uso orale. Le capsule molli non devono essere masticate, disciolte o aperte, ma devono essere deglutite intere con acqua.



Prima o dopo mangiato?

Le capsule molli di Xtandi possono essere assunte con o senza cibo.

E se ne dimentico una da assumere?

Se il paziente dimentica di assumere Xtandi all'ora consueta, la dose prescritta deve essere assunta il più vicino possibile all'orario previsto. Se il paziente ha dimenticato la dose per un'intera giornata, il trattamento deve essere ripreso il giorno successivo con la dose giornaliera abituale.



Come si conserva?

Questo medicinale non richiede alcuna condizione speciale di conservazione, ma comunque si consiglia di tenerlo lontano da fonti di calore e lontano dalla portata dei bambini.



Cibi da evitare di assumere nel periodo di trattamento?

Si consiglia di non assumere pompelmo o succo di pompelmo. Infatti l'uso concomitanti di inibitori potenti del CYP3A4 (**SUCCO DI POLMPELMO**) ne potrebbe alterare la dose assunta.



Quali sono le reazioni avverse più comuni?

- Vampate di calore
- Ipertensione
- Affaticamento
- Fratture
- Cadute

Una particolare attenzione per:

- **Malattia ischemica cardiaca**
- **Convulsioni**



Che succede se ne assumo una dose maggiore per errore?

Non vi sono antidoti per XTANDI. In caso di sovradosaggio, il trattamento con il farmaco deve essere interrotto e devono essere iniziate misure generali di supporto tenendo conto dell'emivita di 5,8 giorni. I pazienti possono trovarsi in una situazione di aumentato **rischio di convulsioni** in seguito a sovradosaggio. Contattare il medico il prima possibile.



Cosa fare nel caso in cui si manifestino sintomi?

Le pazienti devono informare il proprio medico.

