

U.O.S.D. Immunoprofilassi e
Programmi di Prevenzione e
Promozione della Salute

Roma, 31 ottobre 2014

Regolamento Sanitario delle Scuole dell'Infanzia

Premessa

L'Azienda U.S.L., ai sensi della normativa vigente, esercita la sorveglianza igienico - sanitaria nelle Istituzioni Scolastiche del territorio di propria competenza, allo scopo di tutelare e promuovere la salute degli scolari che la frequentano.

Il riferimento sanitario per tutte le problematiche inerenti la tutela e la promozione della salute dei bambini che frequentano la Scuola dell'Infanzia è l'Unità Operativa Dipartimentale Immunoprofilassi e Programmi di Prevenzione e Promozione della Salute, mentre il riferimento per la salute del singolo bambino è il Pediatra di Famiglia.

Procedure di ammissione

L'iscrizione alla scuola dell'infanzia è attualmente subordinata alla autocertificazione, da parte del genitore, riguardo allo stato vaccinale del bambino, con esplicito riferimento alla avvenuta effettuazione delle "vaccinazioni dell'obbligo".

Il Dirigente Scolastico è tenuto a segnalare alla struttura sanitaria competente (U.O.S.D. Immunoprofilassi e Programmi di Prevenzione e Promozione della Salute), coloro che non risultino vaccinati.

Allontanamento del bambino dalla scuola

Il bambino frequenta la comunità quando il suo stato di salute è buono.

Nel caso in cui un bambino , mentre è a scuola, presenti sintomi di particolare rilevanza, si rende necessario allontanarlo , a tutela del singolo e della collettività.

Il genitore, su invito del personale educativo, deve essere prontamente reperibile e disponibile a riportare a casa il bambino.

Le manifestazioni cliniche, a seguito delle quali si deve predisporre l'allontanamento, sono :

- febbre superiore a 38°C
- vomito (più di 2 episodi)
- diarrea (più di tre scariche liquide in tre ore)
- esantema o eruzione cutanea ad esordio improvviso e non altrimenti motivato da patologie preesistenti
- congiuntivite con occhi arrossati e secrezione purulenta
- malessere o altri sintomi tali da impedire al bambino di partecipare alle attività o di richiedere cure che il personale non può fornire
- segni che suggeriscono malattia importante : pigrizia insolita, irritabilità, pianto insolito o persistente, difficoltà respiratorie, dolori addominali persistenti o altri segni insoliti.

In attesa dell'effettivo allontanamento è necessario:

- tenere il bambino in ambiente confortevole, non a diretto contatto con i compagni
- evitare i contatti ravvicinati (< a 50 cm di distanza) e bocca a bocca
- utilizzare guanti monouso se presenti liquidi biologici(sangue, feci, vomito etc.)

