

DOMANDE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PER LE ESIGENZE DELL'A.S.L. ROMA 3 - PROVA SCRITTA - BUSTA 3

1) Negli esiti dei distacchi epifsari si possono osservare:

- A Tutte le alternative proposte
 - B deviazioni angolari degli arti
 - C Nessuna delle alternative proposte
 - D deformità rotatorie degli arti
 - E dismetrie degli arti
-

2) Il nervo ulnare può essere lesionato a seguito di:

- A Fratture dell'epitroclea
 - B Fratture di colles
 - C Fratture dello scafoide carpale
 - D Fratture del capitello radiale
 - E Fratture della clavicola
-

3) In quale di queste patologie si può riscontrare un deficit del nervo ulnare:

- A Gomito valgo
 - B Frattura apofisi coronoide dell'ulna
 - C Lussazione acromion clavicolare
 - D Gomito varo
 - E Rottura del tendine distale del tricipite
-

4) Quale di queste fratture non esposte consolida normalmente in tempi più brevi:

- A Frattura trasversale isolata di tibia
 - B Frattura spiroide tibia e perone
 - C Frattura bifocale di tibia
 - D Frattura trasversale di femore
 - E Frattura comminuta tibia e perone
-

5) Il controblastoma si localizza prevalentemente:

- A Ossa brevi
 - B Ossa piatte
 - C Metafisi ossa lunghe
 - D Epifisi ossa lunghe
 - E Diafisi ossa lunghe
-

6) La artrite tubercolare è tipicamente:

- A Ad evoluzione iperosteosante
 - B Monoarticolare
 - C Poliarticolare
 - D Mai ascessualizzata
 - E Radiologicamente muta
-

7) La sindrome di Dupuytren colpisce più comunemente:

- A Terzo e quarto dito
 - B Quarto e quinto dito
 - C Pollice e indice
 - D Tutte le dita indistintamente
 - E Quarto dito
-

8) **L'osteomielite è più frequente nelle:**

- A Fratture chiuse trattate incruentamente
- B Fratture esposte trattate incruentamente
- C Fratture esposte trattate cruentemente
- D Fratture chiuse trattate cruentemente
- E Nessuna delle alternative proposte

9) **Quale tra i seguenti è fattore prognostico negativo del recupero funzionale dopo frattura di Femore:**

- A Frattura sottotrocanterica
- B Età giovanile
- C Storia di decadimento cognitivo
- D Ritorno al proprio domicilio dopo dimissione
- E Frattura pertrocanterica

10) **Nel femore:**

- A La base della fossa poplitea è determinata dalla cresta intertrocanterica
- B Il tubercolo degli adduttori è laterale
- C La cresta intertrocanterica collega il grande con il piccolo trocantere
- D Il labbro laterale della linea aspra si porta sull'epicondilo laterale
- E Il collo femorale è inclinato di circa 170° sull'asse diafisario

11) **Il blocco articolare di origine meniscale è caratteristico delle:**

- A Tutte le alternative proposte
- B Lesioni radiali del menisco esterno
- C Lesioni orizzontali del corno posteriore del menisco esterno
- D Cisti meniscali esterne
- E Lesioni longitudinali del menisco interno o esterno

12) **Il trattamento di una frattura sottocapitata ingranata in valgo del femore di una casalinga di 64 anni rende indicata:**

- A Gesso d'anca
- B Osteosintesi con viti
- C Artroprotesi
- D Resezione testa femorale (girlestone)
- E Endoprotesi

13) **La misurazione dell'angolo di Boehler serve per:**

- A Misurare curva scoliosi
- B Valutare affossamento e gravità frattura piatto tibiale
- C Valutare gravità scivolamento dell'epifisiolisi dell'anca
- D Valutare deformità angolare in caso di ginocchio valgo
- E Valutare affossamento e gravità frattura calcagno

14) **Nell'artrogriposi sono frequenti:**

- A Il piede torto congenito
- B Lussazione congenita anca
- C Tutte le alternative proposte
- D Nessuna delle alternative proposte
- E Mano torta congenita

15) **La causa più frequente di morte nella Crush Syndrome è:**

- A Infezione
 - B Infarto miocardico
 - C Insufficienza renale acuta
 - D Ipoalbuminemia
 - E Emorragia
-

-
- 16) Indicare quale delle seguenti affermazioni riguardo l'osteogenesi imperfetta è corretta:
- A E' caratterizzata da sclere marroni
 - B Si associa a ritardo mentale nel 95% dei casi
 - C E' caratterizzata da un'elevata fragilità ossea
 - D E' caratterizzata da un'elevata densità ossea
 - E Tutte le alternative proposte
-
- 17) Nello spazio quadrangolare (delimitato dall'omero, dal capo lungo del tricipite, dai muscoli piccolo rotondo e grande rotondo) decorre:
- A Vena cefalica
 - B Nervo sovrascapolare
 - C Nervo circonflesso
 - D Capo lungo del bicipite
 - E Cercine glenoideo
-
- 18) Tra gli agenti patogeni sottoelencati quale può essere il più indicato a determinare un'artrite settica acuta in un bambino di 2 anni:
- A *Clebsiella pneumoniae*
 - B *Streptococco beta emolitico*
 - C *Proteus mirabilis*
 - D *Escherichia coli*
 - E *Haemophilus influenzae*
-
- 19) La lussazione dei tendini peronieri è causata da:
- A Rottura legamento peroneoastragalico posteriore
 - B Rottura legamento peroneoastragalico anteriore
 - C Rottura retinacolo posteriore
 - D Rottura legamento deltoideo
 - E Rottura legamento peroneocalcaneare
-
- 20) Qual è una delle complicanze più comuni della sintesi di capitello radiale con placche?
- A Rigidità articolare
 - B Instabilità posteriore
 - C Dolore cronico
 - D Instabilità posteromediale
 - E Infezioni
-
- 21) Nell'instabilità complessa di gomito:
- A La capsula posterolaterale è raramente lesionata
 - B Il distacco della capsula posterolaterale è quasi sempre associato al distacco del muscolo anconeo
 - C Il distacco della capsula posterolaterale è quasi sempre associato al distacco del muscolo estensore radiale lungo del carpo
 - D Il distacco della capsula posterolaterale non è mai associato al distacco del collaterale laterale
 - E Il distacco della capsula posterolaterale è quasi sempre associato al distacco del collaterale mediale
-
- 22) Durante il posizionamento di una protesi di capitello radiale, quale accortezza devo seguire al fine di evitare l'overstuffing dell'impianto?
- A Tutte le alternative proposte
 - B Il bordo superiore della testa protesica deve essere allo stesso livello del bordo inferiore dell'incisura radiale
 - C Il bordo superiore della testa protesica deve essere allo stesso livello del bordo superiore dell'incisura radiale
 - D Il diametro della testa deve essere proporzionato al diametro del capitulum humeri
 - E Il diametro della testa protesica deve combaciare con il diametro minore del capitello radiale nativo
-

23) In presenza di una frattura scomposta del capitello radiale a 3 frammenti:

- A E' frequente l'associazione di lesioni legamentose
 - B E' opportuno eseguire l'escissione del capitello in ogni caso
 - C +B e C
 - D Va sempre eseguita la sostituzione protesica del capitello
 - E E' opportuno tentare l'osteosintesi in base al grado di comminuzione e qualità dell'osso
-

24) Quale di questi non è un segno radiologico di pseudoartrosi serrata:

- A Osteoporosi a distanza
 - B Maggiore ampiezza della rima di frattura
 - C Callo periostale ipertrofico e slargamento dei monconi "a zampa d'elefante"
 - D Obliterazione del canale midollare
 - E Addensamento o sclerosi degli estremi dei monconi
-

25) Fra i legamenti della colonna:

- A I gialli sono più lunghi
 - B Gli intertrasversari sono detti anche legamenti gialli
 - C Il longitudinale anteriore collega tra loro i processi spinosi
 - D Gli interspinosi sono detti anche legamenti gialli
 - E Il longitudinale posteriore guarda verso il canale vertebrale
-

26) Nel muscolo tricipite branchiale:

- A Il tendine distale si divide ad Y
 - B Il vasto mediale è inserito al tubercolo sottoglenoideo della scapola
 - C Il capo lungo è l'unico non inserito sull'omero
 - D Il vasto laterale è l'unico inserito sull'omero
 - E Il tendine distale è inserito sul radio
-

27) Per "ginocchio del saltatore" si intende:

- A La frattura della rotula
 - B La cisti di Baker
 - C La tendinopatia rotulea
 - D La lussazione recidivante della rotula
 - E La frattura del piatto tibiale
-

28) La manovra di Thomas serve per evidenziare:

- A Una diastasi della pinza malleolare
 - B Una scoliosi lombare
 - C Una lesione del legamento crociato anteriore
 - D Una lombosciatalgia
 - E Un patologico atteggiamento in flessione dell'anca
-

29) L'ascesso di Brodie è:

- A Un tumore gigantomieloma
 - B Una osteomielite ad andamento cronico "ab initio"
 - C Un osteoma osteoide del fondo dell'acetabolo
 - D Una osteomielite acuta del calcagno
 - E La conseguenza di una spondilite tubercolare
-

30) Nelle lesioni mieliche di c6 i mm addominali funzionano rispetto al diaframma come:

- A Agonisti/antagonisti
- B Non hanno capacità di contrarsi
- C Muscoli respiratori
- D Agonisti
- E Antagonisti

**RISPOSTE CORRETTE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED
ESAMI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI
DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
PER LE ESIGENZE DELL'A.S.L. ROMA 3 - PROVA SCRITTA - BUSTA**

3

1 A	2 A	3 A	4 B	5 D
6 B	7 B	8 C	9 C	10 C
11 E	12 B	13 E	14 C	15 C
16 C	17 C	18 B	19 C	20 A
21 B	22 C	23 C	24 B	25 C
26 C	27 C	28 E	29 B	30 B