

BUSTA NON ESTRATTA

MAJ A W

DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 10 POSTI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DIRIGENTE MEDICO – AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE - DISCIPLINA MEDICINA INTERNA, PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 3 - PROVA SCRITTA - BUSTA 1

Handwritten marks and scribbles

-
- 1) Per l'igiene delle mani, l'uso degli idroalcolici è preferibile perché
- A La procedura è più rapida del lavaggio tradizionale
 - B Tutte le risposte sono vere
 - C Non è necessaria una fonte d'acqua
-
- 2) Quale delle seguenti affermazioni è falsa
- A La sincope può essere preceduta da sintomi premonitori
 - B La sincope cardiaca è associata a maggior rischio di morbidità e mortalità
 - C A conclusione dell'iter diagnostico, la causa della sincope si individua in oltre l'80% dei casi
-
- 3) Nel sospetto di neoplasia del pancreas, quale tecnica di imaging è di prima scelta per diagnosi e stadiazione?
- A Tc addome multislice con m.d.c. estesa al torace
 - B Ecografia con mezzo di contrasto
 - C RMN addome con m.d.c.
-
- 4) La terapia della tubercolosi prevede:
- A Isoniazide e Rifampicina per almeno 9 mesi
 - B L'associazione di Rifampicina, Isoniazide, Etambutolo e Pirazinamide per 6 mesi
 - C L'associazione di Rifampicina, Isoniazide, Etambutolo e Pirazinamide per 2 mesi seguita da Isoniazide e Rifampicina per 4 mesi
-
- 5) Il trattamento antibiotico empirico adeguato per una polmonite comunitaria grave ospedalizzata è
- A Meropenem
 - B Ceftriaxone + Azitromicina
 - C Piperacillina-tazobactam
-
- 6) L'epatocarcinoma (HCC)
- A L'infezione acuta da HAV rappresenta un fattore di rischio
 - B E' una complicanza della cirrosi, insieme all'ipertensione portale
 - C Il rischio di HCC non può essere ridotto dai trattamenti antivirali
-
- 7) In presenza di un valore di emoglobina di 8.5 g/dl
- A L'emotrasfusione è sempre indicata
 - B L'emotrasfusione è indicata in presenza di sindrome coronarica acuta
 - C E' sempre necessario effettuare EGDS
-
- 8) Per contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza
- A Meglio utilizzare antibiotici ad ampio spettro d'azione
 - B E' meglio evitare trattamenti brevi
 - C L'antibiotico deve essere scelto in base alla conoscenza delle resistenze ambientali e degli antibiotici usati precedentemente

-
- 9) **In caso di ictus ischemico acuto**
- A E' necessario effettuare TC encefalo senza m.d.c.
 - B Se il paziente giunge entro le 12 ore dall'esordio dei sintomi deve essere valutato per effettuare trombolisi
 - C La pressione deve essere mantenuta sotto 120/80 mmHg
-
- 10) **La sindrome di Pickwick è caratterizzata da:**
- A Entrambe le risposte sono esatte
 - B Iperventilazione
 - C Sonnolenza improvvisa
-
- 11) **Quale di queste sostanze non stimola l'aggregazione piastrinica?**
- A Prostaciclina
 - B Trombossano A2
 - C Trombina
-
- 12) **La febbre remittente è caratterizzata da**
- A Variazioni giornaliere della temperatura superiori ad un grado con periodi di apiressia
 - B Iperpiressia continua con variazioni giornaliere superiori ad un grado
 - C Iperpiressia continua con variazioni giornaliere inferiori ad un grado
-
- 13) **Quale di queste sostanze non ha interferenze con le statine?**
- A Amoxicillina
 - B Macrolidi
 - C Pompelmo
-
- 14) **Il Rivaroxaban agisce attraverso:**
- A Inibizione diretta della trombina
 - B Inibizione del riciclo della vitamina K
 - C Inibizione diretta del fattore X attivato
-
- 15) **In corso di coagulazione vascolare disseminata (CID):**
- A Si osserva trombocitosi
 - B Il tempo di trombina è normale
 - C Aumentano i prodotti di degradazione del fibrinogeno
-
- 16) **Quale delle seguenti, non è una complicanza dell'ulcera gastrica**
- A Perforazione
 - B Emofioe
 - C Stenosi
-
- 17) **La sindrome di Morgagni-Adams-Stokes può essere determinata da**
- A Sick Sinus Syndrome
 - B Crisi comiziale generalizzata
 - C Respiro di Cheyne-Stokes
-
- 18) **Nello scompenso cardiaco a frazione d'elezione ridotta, la frazione d'elezione deve essere**
- A <40%
 - B <55%
 - C <30%
-

- 19) **Il PESI (Pulmonary Index Severity Index) , utilizzato per la stratificazione del rischio dei pazienti con embolia polmonare, è calcolato sulla base dei seguenti elementi :**
- A Frazione di eiezione, P/A media , Frequenza cardiaca, Frequenza respiratoria, Troponina
 - B Eta', P/A sistolica e diastolica , Frequenza cardiaca, Frequenza respiratoria, satO2.
 - C Eta', Sesso, Storia di neoplasia maligna, Storia di scompenso cardiaco, BPCO, P/A sistolica, Frequenza cardiaca, Frequenza respiratoria, Temperatura corporea, SatO2, Alterazioni stato mentale
-
- 20) **Una iperkaliemia viene definita severa se:**
- A $K > 7.0$ mmEq/l
 - B $K > 7.5$ mmEq/l
 - C $K > 6.5$ mmEq/l
-
- 21) **Si definisce Polmonite Nosocomiale (HAP):**
- A Una polmonite che si sviluppa entro 48 ore dopo il ricovero
 - B Una polmonite in paziente sottoposto a ventilazione meccanica
 - C Una polmonite che si sviluppa oltre 48 ore dopo il ricovero
-
- 22) **Nello studio della sincope cardiogena sono indicati:**
- A ECG, Ecocardiografia, ECG Holter
 - B ECG, Tilt test, Tc cerebrale senza m.d.c.
 - C ECG Holter, Ecodoppler vasi collo, TC cerebrale senza m.d.c.
-
- 23) **Il farmaco più utile per la prevenzione e il trattamento del delirio dell'anziano è:**
- A Midazolam e.v.
 - B Aloperidolo
 - C Diazepam e.v.
-
- 24) **La più frequente complicanza associata all'uso delle glifozine è:**
- A Infezioni urinarie
 - B Tossicità midollare
 - C Insufficienza renale
-
- 25) **Secondo le linee guida ESC 2021, nel paziente a rischio cardiovascolare molto elevato il livello di LDL Colesterolo dovrebbe essere inferiore a:**
- A 65 mg/dl
 - B 55 mg/dl
 - C 45 mg/dl
-
- 26) **In un paziente asintomatico, il riscontro di livelli di amilasemia costantemente elevati nel tempo orienta verso la diagnosi di:**
- A Sofferenza pancreatica secondaria a colelitiasi
 - B Pancreatite cronica
 - C Macroamilasemia
-
- 27) **Si definisce come neutropenia una condizione in cui il numero di neutrofili è:**
- A < 2.500 mm³
 - B < 1.500 mm³
 - C < 500 mm³
-
- 28) **Nella polmonite da SARS Cov-2 senza insufficienza respiratoria quale trattamento è consigliato?**
- A Remdesivir
 - B Desametasone per i.m.

C Azitromicina per os

29) A quale stadio di Malattia Renale Cronica corrisponde un Filtrato Glomerulare di 49 ml/min

- A Stadio 4
 - B Stadio 3b
 - C Stadio 3a
-

30) La terapia di prima scelta per la meningite da *Listeria monocitogenes* è:

- A Ceftriaxone
- B Meropenem
- C Ampicillina