

UOC Gastroenterologia Integrata Ospedale Territorio
Direttore ff Dott.ssa Maria Grazia Mancino

ENTEROSCOPIA CON VIDEOCAPSULA

INFORMAZIONI GENERALI E PREPARAZIONE INTESTINALE

Sig./ra _____

Appuntamento per il _____

Raccomandazioni da seguire nei giorni prima dell'esame

Terapia farmacologica

- Non assumere FANS (ibuprofene, ketoprofene etc) nei 15 giorni prima della procedura
- Sospendere medicinali a base di ferro sette giorni prima dell'esame
- sospendere farmaci che rallentano lo svuotamento gastrico 2 giorni prima dell'esame

I farmaci indispensabili possono essere assunti fino a tre ore prima dell'esame oppure due ore dopo l'ingestione della capsula. I farmaci sublinguali possono essere assunti in qualsiasi momento.

Dieta

Nei 5 giorni precedenti l'esame: non mangiare frutta, verdura, tuberi (patate, carote, rape etc), legumi, cereali integrali o semi (crusca, sesamo, etc.). Può assumere prevalentemente proteine: carne, pesce, uova, formaggi. Sono consentite piccole quantità di pane e pasta non integrali e qualche biscotto non integrale. Bere almeno 1.5 – 2 lt di acqua al giorno nei giorni precedenti l'esame.

Il giorno prima dell'esame:

- Pranzo: possibile consumare un pasto leggero, successivamente dieta costituita da liquidi chiari (camomilla, tisane, tè, brodo senza residui).

Ore 19: preparare la dose 1 di AGPEG PLUS ESSE come segue: dissolvere due bustine di prodotto in 1 lt di acqua

Bere la dose 1 di AGPEGPLUS ESSE nell'arco di 1-2 ore, a seguire bere mezzo litro di liquidi chiari (acqua, camomilla, tè). Si consiglia di bere ciascun bicchiere in modo continuativo e non a piccoli sorsi per evitare di ingerire aria.

Rimanere a digiuno per almeno 12 ore prima della procedura (possibile bere solo acqua, non alimenti o liquidi come caffè o latte).

Il giorno dell'esame:

Il giorno dell'esame alle ore 6.00 :

Preparare la dose 2 di AGPEGPLUS ESSE come segue: dissolvere due bustine di prodotto in 1 lt di acqua

Bere la dose 1 di AGPEGPLUS ESSE nell'arco di 1-2 ore, a seguire bere mezzo litro di liquidi chiari. Si consiglia di bere ciascun bicchiere in modo continuativo e non a piccoli sorsi per evitare di ingerire aria.

ATTENZIONE: Se dovesse comparire nausea è possibile aumentare gli intervalli a 15-25 minuti rallentando l'assunzione del preparato. La soluzione risulta più gradevole se rinfrescata dopo la preparazione. Non aggiungere alla soluzione nessun tipo di sostanza (zucchero, aromatizzanti vari, etc).

- Non assumere farmaci o liquidi nelle due ore prima della procedura e non fumare.
- Indossare indumenti comodi e larghi, non abbigliamento monopezzo.

Durante l'esame:

- Dopo aver ingerito la capsula non assumere cibi o bevande per due ore. Dopo 4 ore è permesso un piccolo spuntino (alcuni cracker/fette biscottate o biscotti). E' comunque consigliabile digiuno e assumere solo liquidi chiari zuccherati.
- Durante la procedura è possibile eseguire la regolare vita quotidiana, evitando attività faticose. Si consiglia di passeggiare per stimolare la peristalsi e favorire il transito della capsula, ed evitare di rimanere a lungo a letto o seduti.
- Evitare luoghi con campi magnetici (ingresso di banche/grandi magazzini)
- Limitare l'uso del cellulare
- Verificare ogni 15 minuti che la luce sul registratore si accenda circa 2 volte al secondo, ad indicare il buon funzionamento dello stesso.
- La capsula viene eliminata per via naturale con le feci. È necessario visionare le feci ad ogni evacuazione per verificare l'espulsione. La capsula è monouso per cui non deve essere conservata.
- Se durante l'esame dovesse comparire vomito o dolore addominale, è necessario prendere subito contatto con il Servizio di Endoscopia.
- Verso la fine della registrazione (9 ore circa) la frequenza del lampeggio diminuirà fino a spegnersi dopo circa 12 ore.
- Finché la videocapsula non sarà espulsa è assolutamente controindicato effettuare una risonanza magnetica (in caso di dubbio eseguire sempre una radiografia dell'addome)

Per qualsiasi necessità contattare il nostro servizio/personale medico _____
0656482128/0656482276

Il servizio di endoscopia